

Tratamiento rápido para las parejas (EPT)

Una guía para las parejas

¿Por qué me dan este medicamento?

- Tu pareja está tomando un medicamento para la clamidia. La **clamidia** es una ITS (infección que se contagia en las relaciones sexuales) que puedes tener después del sexo oral, anal o vaginal.
- Un proveedor de servicios de salud le dio un medicamento a tu pareja para que te la de a ti para tratar la clamidia. Puedes tener clamidia aunque no tengas síntomas. Si no tienes clamidia, este medicamento no te hará nada. Este medicamento se toma para que no tengas problemas de salud graves o para que no les pases la infección a otros. Esto se llama **Tratamiento rápido para las parejas (EPT)**.
- El **EPT** es una manera fácil, rápida y privada de tratarte. El medicamento es seguro y funciona bien cuando se usa enseguida.

¿Por qué tengo que tomar este medicamento?

- Si no se trata, la clamidia puede causar problemas de salud serios.

Problemas de salud graves que puedes tener:

- **PID (Enfermedad inflamatoria de la pelvis)**. La PID puede causar dolor y afecta los órganos reproductivos.
- **Embarazo ectópico** (un embarazo en las trompas de Falopio)
- **Infertilidad** (no poder tener hijos)

¿Qué es este medicamento?

- Los medicamentos que tratan la clamidia son **Azitromicina** (Zithromax) y **Doxiciclina**. Estos son **antibióticos** (medicamentos que ayudan a curar las infecciones).
- Este medicamento tratará la clamidia, **pero no tratará otras ITS**.
- No debes tomar este medicamento si eres alérgico a la **doxiciclina** o a la **azitromicina**.

¿Cómo debo tomar el medicamento?

- Toma todas las pastillas como te lo pidan. Es importante que termines todas las pastillas.
- Puedes tomar el medicamento con el estómago lleno (junto con las comidas) o con el estómago vacío (al menos 1 hora antes de comer o 2 horas después de comer).
- **Si vomitas hasta una hora después de tomar el medicamento, no funcionará y tienes que tomar más.** Llama al número de teléfono que aparece abajo para planear una visita a la clínica de CHN.

Si piensas que puedes tener otra ITS, visita una clínica de CHN para hacerte pruebas.

Después de tomar este medicamento, ¿qué debo hacer?

- **No tengas sexo (vaginal, oral o anal) por 7 días después de que tú y todas tus parejas hayan sido tratados.** El medicamento tarda 7 días en funcionar.
- Es una buena idea hacerte pruebas para ver si tienes una ITS **cada 3 o 6 meses.**

¿Hay efectos secundarios?

- Normalmente no, pero puede haber efectos secundarios (reacciones al medicamento).

Si tienes algún efecto secundario grave después de tomar este medicamento, llama al 911 o visita la sala de emergencia de inmediato.

Efectos secundarios normales que puedes tener:	No es común tener efectos secundarios graves, pero puede suceder:
<ul style="list-style-type: none">• Diarrea• Náuseas• Dolor de estómago• Dolor de cabeza• Vómitos	<p>Algunas personas pueden tener alergia al medicamento. Esto puede causar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Problemas para respirar• Presión en el pecho• Garganta cerrada• Hinchazón de los labios o la lengua• Urticaria (ronchas que pican en la piel)

¡Si tienes alguna pregunta, consulta a tu educador o a tu proveedor de servicios de salud de CHN!