


Estreptococo del grupo B (GBS) y embarazo

¿Qué es el estreptococo del grupo B (GBS)?

- El estreptococo del grupo B (GBS) es una bacteria (germen) que vive en el cuerpo. Vive en la vagina y en el recto. **No** es una ITS (una infección que se contrae a través del sexo).
- Generalmente, el GBS no causa una enfermedad grave. Algunas personas tienen la bacteria GBS en el cuerpo, pero no tienen síntomas.

¿Cómo me afecta el GBS si estoy embarazada?

- La mayoría de las personas embarazadas que tienen la bacteria GBS no tienen síntomas ni problemas de salud. Sin embargo, a veces el GBS puede causar infecciones en el útero o en el tracto urinario (los órganos del cuerpo que producen, almacenan y eliminan la orina [pis]).
- Si una persona tiene EGB al final del embarazo, existe la posibilidad de que se lo transmita al bebé durante el parto.



¿Cómo afecta el GBS a mi bebé?

Los recién nacidos pueden tener 2 tipos de infecciones por EGB. Los dos tipos pueden ser graves.

- **Las infecciones de aparición temprana** ocurren durante la primera semana de vida (generalmente en las primeras 24 a 48 horas). Estas infecciones se pueden transmitir al bebé durante el parto.
 - Si un bebé nace antes de las 37 semanas, puede tener más riesgo de contagiarse.
 - Estas infecciones pueden provocar problemas de salud graves, como infecciones en los pulmones y en la sangre, y meningitis (una infección que causa inflamación en el cerebro).
- **Las infecciones de aparición tardía** ocurren después de los primeros 6 días de vida. Estas infecciones pueden transmitirse al bebé durante el parto o por contacto con alguien que tenga GBS.
 - Los signos de una infección de aparición tardía en los bebés incluyen: lentitud o falta de actividad, fiebre alta, mala alimentación y vómitos. Llame al médico de su bebé de inmediato si tiene alguno de estos síntomas.
 - Estas infecciones pueden provocar problemas de salud graves, como meningitis y neumonía.

¿Se pueden prevenir estas infecciones?

Las pruebas y el tratamiento pueden ayudar a prevenir infecciones de aparición temprana en su bebé

- Puede hacerse la prueba de GBS al final de su embarazo (entre la semana 35 y la 37). Su médico tomará una muestra de su vagina y recto para ver si tiene GBS.
- Si la prueba muestra que tiene GBS, es probable que le den antibióticos (medicamentos que ayudan a tratar las infecciones). Estos medicamentos solo funcionan si las toma durante el trabajo de parto.

¡Hable con su proveedor de CHN si tiene más preguntas!