

# 接种强生疫苗

由于 COVID-19 疫苗是新疫苗，因此您可能会对在接种该疫苗（注射）之前、期间和之后的具体事项存有一些疑问。使用此文字资料来了解更多信息，如果您还有更多问题，请与 CHN 医生或护士沟通。

## 具体事项：

### 接种疫苗之前：

- 与 CHN 医生或护士沟通，了解是否建议您现在接种 COVID-19 疫苗。
- 如果您对疫苗存有疑问，请咨询我们！我们随时提供帮助。



### 接种疫苗期间：

- CHN 医生或护士会给您：
  - 一份说明您将接种哪种 COVID-19 疫苗的文字资料。
  - 同意书。您在同意书上提供的信息（例如您的年龄和出生日期）将被报告给纽约市卫生局的  
全市免疫注册中心。
- 注射部位在上臂。

### 接种疫苗之后：

- 由于我们还在不断了解有关疫苗实际效果的信息，请务必通过以下方式继续保护自己和其他人免于感染 COVID-19：
  - 在公共场合戴口罩遮住口鼻。
  - 与他人保持至少 6 英尺的距离。
  - 勤洗手。
  - 远离人群。

## 疫苗是否有任何副作用？

- 接种疫苗后可能会有一些副作用。这些副作用表明您的身体正在建立针对 COVID-19 的保护。您可能会感觉像是得了流感，不过副作用在几天后便会消失。



### 常见的副作用包括：

- 注射部位疼痛、发红或肿胀
- 头痛
- 感觉非常疲倦
- 肌肉疼痛
- 发热
- 恶心

### \* 严重过敏反应的迹象包括：

- 呼吸困难
- 面部或喉咙肿胀
- 心跳加快
- 全身出疹子
- 晕眩
- 虚弱

疫苗引起严重过敏反应的概率很小。这些反应可能会在接种疫苗后几分钟到一小时内发生。因此，CHN 的医生或护士可能会要求您在中心待一段时间，以确保您没有反应。

**重要安全信息：**强生疫苗与一种非常罕见且严重的凝血之间可能存在联系。接种疫苗 3 周后，如果您有以下一种或多种症状，请立即就医：

- 严重或持续性头痛（头痛不会消失）、视力模糊、呼吸急促、胸痛、腿肿胀、胃痛，并且在注射部位以外的皮下容易出现瘀伤或细小血斑。

## 如果我出现副作用，应该与谁联系？

- 接种疫苗后，请与 CHN 医生或护士沟通您出现的任何副作用。
- 美国疾病控制与预防中心 (CDC) 已设置多种工具，供您报告接种疫苗后的副作用和其他有关个人体验的信息。这些工具有助于他们实时查看此疫苗的安全性。

**V-safe** 是一种可在智能手机上使用的工具，用于报告任何副作用。

- 注册 **V-safe** 时，它会要求您输入电话号码。这样以来，您可以接收包含健康状况检查信息的短信，以便查看接种疫苗后的状况。您输入 V-safe 的任何个人信息都将受到保护。
- **V-safe** 是一种自愿使用的工具。由您自行选择是否注册。如果您决定不使用 V-Safe，请在接种疫苗后立即告知 CHN 医生或护士您是否出现严重副作用。
- 患者和提供者还可以使用疫苗不良事件报告系统 (VAERS) 报告副作用。请访问 [vaers.hhs.gov/reportevent.html](http://vaers.hhs.gov/reportevent.html)，了解更多信息



请前往 [www.cdc.gov/vsafe](http://www.cdc.gov/vsafe) 或使用智能手机扫描二维码，了解更多信息。