

# 接种辉瑞 COVID-19 疫苗

由于 COVID-19 疫苗是新疫苗，因此您可能会对在接种该疫苗(注射)之前、期间和之后的具体事项存有一些疑问。使用此传单来了解更多信息，如果您还有更多问题，请与医生或护士沟通。

## 具体事项：

### 接种疫苗之前：

- 与医生或护士沟通，了解是否建议您现在接种 COVID-19 疫苗。
- 如果您对疫苗存有问题，请咨询我们！我们随时提供帮助。



年龄在 12-15 岁的人现在可以接种辉瑞疫苗。如果您未满 18 岁，您的父母或监护人必须同意您接种疫苗。

### 接种疫苗期间：

- 注射部位在上臂。

### 接种疫苗之后：

- 您需要在 21 天之内返回中心接种第二剂疫苗。您需要接种两剂才能得到充分保护。
- 由于我们还在不断了解有关疫苗实际效果的信息，请务必通过以下方式继续保护自己和其他人免于感染 COVID-19：
  - 在公共场合戴口罩遮住口鼻。
  - 与他人保持至少 6 英尺的距离。
  - 勤洗手。
  - 远离人群。

首剂预约日期： \_\_\_\_\_

次剂预约日期： \_\_\_\_\_



# 疫苗是否有任何副作用？

- 接种疫苗后可能会有一些副作用。这些副作用表明您的身体正在建立针对 COVID-19 的保护。您可能会感觉像是得了流感，不过副作用在几天后会消失。
- 据我们目前所知，有人报告称在注射次剂 COVID-19 疫苗后会有出现更多的副作用。

常见的副作用：	何时致电医生：
<ul style="list-style-type: none"><li>• 注射部位疼痛或肿胀</li><li>• 发热和发冷</li><li>• 疲劳</li><li>• 头痛</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果您在注射 24 小时后红肿和疼痛加重</li><li>• 如果副作用加重或几天后仍不消失</li><li>• 紧急情况请致电 <b>911</b>。</li></ul>

## 如果我出现副作用，应该与谁联系？

- 有关您可能有的任何副作用，请与您的 PCP 联系。如果您没有 PCP，请致电 866-246-8259 与 CHN 联系
- 美国疾病控制与预防中心 (CDC) 已设置多种工具，供您通过 V-Safe 报告副作用。

**V-safe** 是一种可在智能手机上使用的工具，用于报告任何副作用。借助 V-safe，您还可以提醒自己何时需要前来注射次剂。

- 注册 **V-safe** 时，它会要求您输入电话号码。这样以来，您可以接收包含健康状况检查信息的短信，以便查看接种疫苗后的状况。您输入 V-safe 的任何个人信息都将受到保护。
- **V-safe** 是一种自愿使用的工具。如果您决定不使用 V-Safe，请在接种疫苗后立即告知医生或护士您是否出现严重副作用。
- 患者和提供者还可以使用疫苗不良事件报告系统 (**VAERS**) 报告副作用。请访问 [vaers.hhs.gov/reportevent.html](https://vaers.hhs.gov/reportevent.html)，了解更多信息



请前往 [www.cdc.gov/vsafe](https://www.cdc.gov/vsafe) 或使用智能手机扫描二维码，了解更多信息。