Tricomoniasis

¿Qué es la tricomoniasis?

La tricomoniasis o **tric** es una ITS (infección de transmisión sexual) que una persona puede contagiarse por medio del sexo oral, vaginal o anal. También puedes contagiarte tric por el contacto entre genitales.

¿Cómo sé si tengo tric?

La mayoría de las personas no tienen signos de tric. La única forma de saber si tienes tric es realizarte un análisis.

Signos de tric:

Las mujeres pueden tener:

- secreciones con mal olor o que se sientan diferente
- sangrado leve
- picazón dentro de la vagina o alrededor de
- la necesidad de hacer pis con frecuencia
- dolor o ardor al hacer pis

Los hombres pueden tener:

- secreciones
- la necesidad de hacer pis con frecuencia
- Dolor o ardor al hacer pis

¿Cuáles son los riesgos de la tric?

- Tener tric aumenta tus posibilidades de tener VIH u otras ITS.
- Las mujeres embarazadas con tric pueden tener a sus bebés de forma prematura.

¿Cual es el tratamiento contra la tric?

Puedes tomar medicamentos para tratar la tric. Tú y tu pareja deben tomar el medicamento. Si tu pareja no toma el medicamento, puedes volver a tener tric.

Mientras tomas el medicamento:

- toma todo el medicamento, incluso si te sientes mejor
- no tengas sexo
- no tomes alcohol

Después de que tomes el medicamento:

- realizate un análisis a los 3 meses
- siempre usa condones







Protégete a ti mismo y a tu pareja de la tric

Realizate un análisis.

- Mujeres: tu prestador de salud usará un hisopo para obtener una muestra de tu vagina. Se analizará esta muestra para ver si tiene tric.
- Hombres: tu prestador de salud usará un hisopo para obtener una muestra de tu uretra. Se analizará esta muestra para ver si tiene tric.

Usa condones.

• Los condones ayudan a protegerte de la tric y otras infecciones que se trasmiten a través del sexo.

Condones externos. Se colocan en el pene. Utilízalos para tener sexo oral, vaginal o anal.





Para saber más sobre la tric, ¡habla con tu educador de la salud de CHN o tu médico!