

快速伴侣疗法：滴虫病

伴侣指南

为什么我要服用这种药？

- 您的伴侣正在接受毛滴虫病（trich）的治疗。滴虫病是一种 STI（性传播感染），可以通过阴道性交感染。在性行为过程中，寄生虫可以从阴茎传播到阴道，从阴道传播到阴茎，或从阴道传播到阴道。这种寄生虫感染其他身体部位（如手、口腔或肛门）的情况并不常见。
- 医务人员已为您的伴侣开了药，转交给您以治疗滴虫病感染。即使没有任何症状，您也可能感染了滴虫病。如果您没有滴虫病，此药不会有任何作用。此药物的作用是防止您发展出严重的健康问题或将感染传给他人。这被称为快速伴侣疗法（EPT）。
- **EPT** 是一种简便、快速且私密的治疗方法。只要使用方法正确，这种药物是安全且有效的。

为什么我应该服用这种药物？

如果不加以治疗，滴虫病会导致严重的健康问题。它会使您更有可能感染和传播其他性传播感染，包括生殖器炎症，使人更容易感染 HIV。如果不进行治疗，毛滴虫感染可能会持续数月或数年。

可能发生的严重健康问题包括：

- **盆腔炎**——可引起疼痛并影响生殖器官。
- **异位妊娠**——输卵管妊娠。
- **不孕不育**——无法生育。

这是什么药？

- 用于治疗滴虫病的药物是甲硝唑（Metronidazole）。这是一种抗生素药片（有助于抵抗感染的药物）。
- 这种药物可以治疗滴虫病，但不能治疗其他 STI。
- 如果您对甲硝唑过敏，或者如果您有严重的健康问题，则不应服用此药。请立即咨询医务人员，看看哪种治疗方法最适合你。
- 如果您出现任何更严重感染的症状，请立即就医。这些症状包括腹部或盆腔、睾丸疼痛，发烧、恶心或呕吐。

我应该如何服用这种药物？

- 请按照医嘱服用所有药物。务必服完所有药剂。
- 您可以在饱腹（随食物一起）或空腹（至少在饭前 1 小时或饭后 2 小时）的情况下服用该药。
- 服药期间请勿饮酒。在完成药物治疗后，至少 3 天内不能饮酒。
- 如果您在服药后一小时内呕吐，则药物不起作用，您需要再服药。请致电以下电话号码以安排访问 CHN 诊所就诊。

如果您认为自己可能患有其他 STI，请到 CHN 诊所接受检测。

在服用此药后，我该怎么办？

- 在您和所有伴侣完成治疗后的 7 天内不要发生性行为（阴道、口交或肛交）。药物需要整整一周的时间才能发挥作用。
- 服用所有的药剂。在服用最后一粒药后等待 7 天才能再进行性行为。
- 即使您的伴侣已经接受了治疗，您也应在治疗后 3 个月左右再次接受检查。

是否有任何副作用？

- 通常不会，但也可能出现副作用。

可能发生的常见副作用：	严重的副作用很少见，但有时可能发生：
<ul style="list-style-type: none">• 腹泻• 恶心• 胃痛• 头痛• 呕吐	<p>有些人可能会对药物产生过敏反应。这些反应可能导致：</p> <ul style="list-style-type: none">• 呼吸困难• 胸闷• 咽喉闭塞• 嘴唇或舌头肿胀• 荨麻疹（皮肤上的瘙痒性肿块）

如果您在服用这种药物后出现严重副作用，请立即拨打 911 或前往急诊室。