

Poussée dentaire

La poussée dentaire correspond à l'apparition des premières dents chez votre bébé (généralement entre 3 et 12 mois). Les poussées dentaires peuvent être douloureuses pour les bébés et source de stress pour les adultes. Amenez votre bébé chez le dentiste dès que vous commencez à voir des dents. Le dentiste vérifiera que les dents de votre bébé poussent correctement. Cela leur permettra également d'avoir moins peur du dentiste et les aidera à prendre de bonnes habitudes de santé dès leur plus jeune âge.

Quels sont les signes de la poussée dentaire ?

- Problèmes d'endormissement et manque d'appétit
- Agitation
- Éruption cutanée autour de la bouche provenant d'un excès de salivation
- Gonflement des gencives
- Légère fièvre
- Selles molles
- Frottements des gencives avec des jouets et les doigts
- Frottements et tiraillements des oreilles



Comment soulager mon bébé ?

- Essuyez le visage de votre bébé avec un tissu propre pour éliminer la bave et prévenir les éruptions cutanées.
- Mettez un tissu humide au congélateur pendant 30 minutes (pas plus longtemps, sinon, il sera trop dur et risque de faire mal aux gencives enflées). Utilisez-le pour frotter leurs gencives ou laissez-le le mâchouiller, et lavez-le après chaque utilisation.
- Mettez des anneaux de dentition au réfrigérateur et donnez-les au bébé pour qu'il puisse les mâchouiller ou les frotter sur ses gencives pour se soulager.

Essayer



Éviter



- Si vous utilisez un anneau de dentition qui peut être mis au congélateur, assurez-vous qu'il ne contient que de l'eau et aucun produit chimique.
- N'attachez pas d'anneaux de dentition autour du cou et ne lui portez pas de colliers avec de petites perles. Ces derniers peuvent se détacher et entraîner un risque d'étouffement pour votre bébé.



Scannez ce code plus d'informations sur la santé de votre bébé.



212.545.2400



chnyc.org



Community
Healthcare Network