

Tratamiento expedito para la pareja: gonorrea

Una guía para la pareja

¿Por qué debo recibir este medicamento?

- Su pareja está en tratamiento por **gonorrea**. La gonorrea es una ITS (infección de transmisión sexual) que se puede contagiar mediante el contacto sexual por la boca, por el ano o por la vagina.
- A Su pareja recibió un medicamento de un proveedor médico, que le entregará a usted para tratar la gonorrea. Es posible que tenga gonorrea incluso sin síntomas. Si no tiene gonorrea, este medicamento no hará ningún efecto. Este medicamento es para que no tenga problemas graves de salud y para que no contagie a otras personas. Esto se llama tratamiento **expedito para la pareja (EPT, por sus siglas en inglés)**.
- El **EPT** es una manera fácil, rápida y privada de recibir tratamiento. El medicamento es seguro y funciona si se usa de la manera correcta.

¿Por qué debo tomar este medicamento?

- Si no se trata, la gonorrea puede llevar a problemas graves de salud.

Problemas graves de salud que pueden ocurrir:

En las mujeres:

- **Enfermedad inflamatoria pélvica:** puede causar dolor y afecta los órganos reproductivos.
- **Embarazo ectópico:** un embarazo que ocurre en las trompas de Falopio.
- **Infertilidad:** no poder tener hijos.

En los hombres:

- una afección dolorosa en los tubos que están unidos a los testículos que puede, pocas veces, causar infertilidad.

¿Cuál es este medicamento?

- El medicamento que trata la gonorrea es el **Suprax** (cefixima). Es un **antibiótico** (medicamento que ayuda a eliminar las infecciones).
- Este medicamento cura la gonorrea, pero no **funciona con otras ITS**.
- No debe tomar este medicamento si es alérgico al **Suprax** o si tiene problemas graves de salud. Hable con un proveedor médico lo antes posible para saber qué tratamiento es el mejor para usted.
- Si presenta síntomas de una infección más grave, busque atención médica de inmediato. Los síntomas pueden ser dolor de estómago, pelvis o testículos; fiebre; náuseas o vómitos.

¿Cómo tomo este medicamento?

- Tome todas las píldoras como se lo indicaron. Es importante que las tome todas.

Si cree que puede tener otra ITS, visite una clínica de CHN para realizarse pruebas.

¿Qué debo hacer luego de tomar este medicamento?

- **No tenga relaciones sexuales (por la vagina, la boca o el ano) durante los siete días posteriores a que usted y sus parejas hayan completado el tratamiento.** El medicamento tarda una semana completa en hacer efecto.
- **Tome todas las píldoras.** Espere siete días después de haber tomado la última píldora para tener relaciones sexuales.
- No comparta el medicamento contra la gonorrea con otras personas.
- Deberá volver a realizarse pruebas unos tres meses después del tratamiento, incluso si su pareja también lo recibió.

¿Tiene efectos secundarios?

- No sucede con frecuencia, pero puede haber efectos secundarios.

Los efectos secundarios posibles más comunes son los siguientes:	Los efectos secundarios graves son poco comunes pero posibles:
<ul style="list-style-type: none">• Diarrea• Náuseas• Dolor de estómago• Dolor de cabeza• Vómitos	<p>Algunas personas pueden tener reacciones alérgicas al medicamento. Estas reacciones pueden causar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dificultad para respirar• Sensación de presión en el pecho• Cierre de la garganta• Hinchazón de los labios o de la lengua• Erupciones cutáneas (ronchas y picazón en la piel)

Si tiene alguno de los efectos secundarios graves luego de tomar el medicamento, llame al 911 o vaya a emergencias lo antes posible.