

Aborto con medicamentos en CHN

El [aborto con medicamentos](#) es una opción segura y efectiva para terminar un embarazo temprano (hasta 11 semanas). Lea la información en este documento para conocer más sobre cómo abortar con medicamentos en CHN y qué puede esperar.

En la consulta:

Su médico hablará con usted sobre el aborto con medicamentos, cómo funciona y si hay algún riesgo. Le dará una [guía de medicamentos](#) y le pedirá que lea y firme un [formulario de acuerdo del paciente](#).

Preparación:

Antes de tomar los medicamentos, es buena idea asegurarse de que tiene los suministros adecuados. Aquí tiene una lista que puede usar para prepararse:

- ___ Compre toallas higiénicas
- ___ Compre o pida prestada una almohadilla térmica
- ___ Consiga sus snacks favoritos o comida reconfortante
- ___ Elija ropa cómoda para usar
- ___ Pregunte a su médico sobre cualquier medicamento que pueda necesitar para el dolor o las náuseas
- ___ Obtenga una nota del médico para la escuela o el trabajo por si necesita faltar

Qué medicamentos tomará:

Su médico le dará dos medicamentos diferentes: [Mifepristona](#) y [Misoprostol](#).

Es importante que usted tome estos medicamentos de la manera correcta para que funcionen. Lea las instrucciones en la página siguiente para conocer más sobre cómo tomar estos medicamentos.



Día uno:

Tome 1 pastilla de Mifepristona

Usted tomará esta pastilla por la boca mientras esté en el consultorio. Ponga la pastilla en su lengua. Tome un sorbo de agua para tragar la pastilla.

Escriba la **fecha y hora** en que tomó esta pastilla.

Fecha: _____ Hora: _____

Después de tomar Mifepristona, usted puede tener calambres y sangrado vaginal. Puede sentir náuseas o debilidad y es posible que vomite o tenga diarrea.

Hable con su médico sobre la mejor manera de aliviar el dolor o los efectos secundarios.

- Su médico podría recomendarle que tome (o podría recetarle) Ibuprofeno, un medicamento para las náuseas o uno para la diarrea.
- Retire sus medicamentos de la farmacia o de la clínica antes de irse a casa.
- Use una almohadilla térmica para aliviar los calambres.
- Beber agua puede ayudar a que se sienta mejor.



24 - 48 horas después de tomar Mifepristona:

Tome 4 pastillas de Misoprostol


En cualquier momento entre 24 y 48 horas después de tomar la primera pastilla, deberá tomar un segundo medicamento llamado **Misoprostol**. **Debe tomar Misoprostol incluso si ya comenzó a sangrar.**

Elija un momento en el que haya comido bien y descansado. Para aliviar los calambres, tome 1 pastilla de Ibuprofeno 1 hora antes de tomar Misoprostol.

Ponga 2 pastillas entre sus dientes y sus mejillas (4 pastillas en total).

Espere **30 minutos**.

Beba agua para tragar lo que queda de las pastillas.



Si su embarazo tenía de 9 a 11 semanas, necesitará una segunda dosis de Misoprostol. Espere 4 horas. Lávese las manos. Ponga 4 pastillas más de Misoprostol en sus mejillas. Déjelas en sus mejillas por 30 minutos, después traguelas con agua.

Consulte nuestro documento [Después de su aborto con medicamentos](#) para conocer más sobre qué esperar después de tomar estos medicamentos y qué atención de seguimiento necesitará.