Opciones que sólo contienen Progestina

Sin Estrógeno / Se pueden usar si esta amamantando

	DIU con hormonas	Implante Anticonceptivo	Inyección	Pastillas Anticonceptivas de Progestina Sola
Marcas	Mirena®, Skyla®, Liletta®, Kyleena®	Nexplanon®	Depo-Provera®	Camila®, Nor-QD ®, u otros
¿Qué tan bien funciona?	> 99%	> 99%	96%	93%
¿Dónde puedo conseguirlo?	Un proveedor de salud coloca el DIU en el útero. Por lo general, el proveedor de salud lo remueva.	Después de adormecer su piel, un proveedor de salud introduce el implante bajo la piel de su brazo. Un proveedor de salud tiene que removerlo.	Tiene que inyectarse cada 3 meses (11-15 semanas). Puede obtener la inyección en una oficina médica o puede inyectarse usted mismo.	Un proveedor de salud manda una receta a la farmacia. Opill® es la única marca disponible sin receta en tiendas o en línea.
¿Cómo usarlo?	Cuando el DIU este colocado, no necesita hacer nada.	Cuando el implante este colocado, no necesita hacer nada.	Repita la inyección cada 3 meses (11-15 semanas)	Tome una pastilla todos los días.
El impacto en el sangrado	Puede mejorar los calambres menstruales. Puede reducir el sangrado mensual. Puede dejar de menstruar.	Puede causar sangrado irregular y manchado entre los periodos. Después de usarlo durante 1 año, muchos usuarios dejan de menstruar. Puede mejorar los calambres menstruales. Después de 1 año, puede causar un periodo ausente. Puede mejorar las calambres.	Usualmente, reduce el sangrado mensual. Puede causar sangrado irregular, manchado entre los periodos, o un periodo ausente. Puede tener sangrado irregular hasta un año después de su última inyección.	Puede aleviar el dolor del sangrado mensual y hacerlo más regular. Puede causar manchado entre los periodos durante los primeros meses.

Opciones que sólo contienen Progestina

Sin Estrógeno / Se pueden usar si esta amamantando

DIU con hormonas

Implante Anticonceptivo



Pastillas Anticonceptivas de Progestina Sola



Datos importantes

Puede durar hasta 3 a 8 años, dependiendo del DIU que elija Puede embarazarse inmediatamente después de que se lo retire.

Puede disminuir el riesgo de contraer el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario.

Raras veces, se daña el útero durante la inserción.

Puede durar hasta 5 años Puede embarazarse inmediatamente después de que se lo retira.

Puede disminuir el riesgo de contraer el cáncer de endometrio y el cáncer ovario.

Cambios a su menstruación puede durar hasta 6 meses después de que se lo retira. Cada inyección dura 3 meses (11-15 semanas).

La inyección es privada para los usuarios.

Ayuda prevenir el cáncer del útero. Puede causar el aumento de peso, cambios en el cabello o en la piel, y cambios en el deseo sexual.

Puede disminuir el riesgo de contraer el cáncer de endometrio y el cáncer ovario.

Los efectos secundarios pueden durar hasta algunos meses después de la última invección. La posibilidad de embarazarse es inmediata una vez que deja de tomarlas.

Puede disminuir el riesgo de contraer el cáncer del endometrio y el cáncer ovario.

Puede causar cambios en el cabello o en la piel, y cambios en el deseo sexual.

